

COLOPATHIE ET MÉSOTHÉRAPIE

Docteur Christophe Danhiez¹

DÉFINITION :

Perturbation de la sensibilité viscérale.
Hypersensibilité intestinale aux ballonnements.
Beaucoup ont les caractéristiques d'une colite inflammatoire.
Parfois accompagnée de migraine, pollakiurie ou lombalgie.
Une diverticulose est très souvent retrouvée lors de la coloscopie.
Contexte neurotonique très fréquent à prendre en compte.
Notion de facteurs déclenchant et d'évolution par crise.

Une classification a été établit par les sociétés de gastro entérologies, le diagnostic est maintenant fait grâce aux critères de ROME :

- Douleurs abdominales.
- Modification de la fréquence des selles.
- Modification de la consistance des selles.
- Modification de l'évacuation des selles.
- Ballonnements et distension.
- Emission de mucus.

Pour pouvoir parler de colopathie, il faut la présence d'au moins 2 critères pendant au minimum 3 mois.

MATÉRIELS UTILISÉS :

Selon les habitudes de chacun on pourra opter pour une Mésothérapie manuelle ou assistée avec un auto injecteur (norme CE).

Le matériel sera stérile et à usage unique, soit en utilisant des kits existants (kit mixte® le plus complet), ou des seringues et aiguilles (0,4 x 4, 0,29 x 13) stériles.

Le port de gants est recommandé, non stériles.
Compresse.

PRODUITS UTILISÉS :

Double désinfection cutanée à la Biseptine® ou à défaut à l'alcool 60°.

| DCI | Nom commercial |
|-----------------------|----------------|
| Lidocaïne | Mésocaïne 1%® |
| Phloroglucinol | Spasfon® |
| Pidolate de Magnésium | Mag 2® |

Traitement de la neuro dystonie :

| DCI | Nom commercial |
|---------------|----------------|
| Amitriptyline | Laroxyl® |
| Diazepam | Valium® |

Traitement de la lombalgie :


| DCI | Nom commercial |
|------------------|----------------------|
| Piroxicam | Zofora® |
| Thiocolchicoside | Colthiozid®, Miorel® |

TECHNIQUES UTILISÉES :

Toujours une technique MIXTE associant :

Une technique superficielle, Nappage (IDS) ou Technique épidermique selon le Dr J.J PERRIN (IED). Le choix de cette technique sera opérateur dépendant, aucune étude n'ayant démontrée la supériorité de l'une par rapport à l'autre.

Une technique plus profonde de 4mm (IDP) à 6-8mm en fonction du pannicule adipeux.



Les points de technique profonde seront réalisés tout le tour du cadre colique en partant de la fosse iliaque droite, colon ascendant, transverse puis colon descendant, en respectant le sens du péristaltisme intestinal, chacun de 0,1ml.

Des points profonds seront également réalisés en regard des plexus selon la cartographie neuro viscérale du Dr D. MREJEN.

¹ Enseignant DIU DE Mésothérapie de la Pitié Salpêtrière

La revue de Mésothérapie

Le nappage sera réalisé sur l'ensemble de l'abdomen.
Bien sûr ces techniques seront également utilisées pour le traitement du terrain, en utilisant les points de dysneurotonie (cartographie du dr BONNET), et des symptômes associés (lombalgie...).

MÉLANGES :

Nous n'aborderons ici que les mélanges destinés au traitement de la colopathie.

Le plus souvent :

- Mésocaïne 1%® 2ml
- Spasfon® 2ml
- Mag 2® 2ml

En IED et IDP

En cas de stress important, utilisé le même mélange pour les points profonds, et en technique superficielle on utilisera :

- Mesocaïne 1%® 2ml
- Laroxy1® 0,5ml
- Mag 2® 2ml

RYTHME DES SÉANCES :

J0, J7 +/- J14.

Puis une séance d'entretien tous les 1 ou 2 mois en fonction de la clinique.

Traitement associés du terrain (neurodystonie), et des doléances associées (lombalgie...).

LE BUT EST DE RÉDUIRE LA FRÉQUENCE ET
L'INTENSITÉ DES CRISES.